

PLANCHE II

- A-D, *Carcinoplax longimanus* (de Haan). Chélicèdes devenant démesurés chez le mâle au-delà d'une certaine taille ; une proéminence à la face interne de la main des deux chélicèdes dans les deux sexes ; pas de coloration noire des doigts : A, A1, ♂ 56,4 × 76,4 mm, MUSORSTOM 2, st. 12 (MNHN-B 10048) : A, chélicèdes, face externe ; A1, *id.*, face interne ; B, B1, ♀ ovigère 56 × 74,2 mm, MUSORSTOM 2, st. 72 (MNHN-B 10053) : B, chélicèdes, face externe ; B1, chélicèdes droit, face interne ; C, C1, ♀ 31 × 38,9 mm, Madagascar, chalutage 47 (MNHN-B 10047) : C, chélicèdes, face externe ; C1, *id.*, face interne ; D, D1, juv. 11 × 13 mm, Madagascar, chalutage 47 (MNHN-B 10047) : D, chélicèdes droit, face externe ; D1, *id.*, face interne.
- E-G, *Carcinoplax indica* Doflein. — Chélicèdes ne devenant pas démesurés chez le mâle mais s'épaississant beaucoup ; pas de proéminence à la face interne de la main ; coloration noire des doigts dans la moitié distale. E, E1, ♂ 34,6 × 41 mm, MUSORSTOM 1, st. 11 (MNHN-B 10061) : E, chélicèdes, face externe ; E1, *id.*, face interne. F, ♂ 20,1 × 23,5 mm, MUSORSTOM 2, st. 26 (MNHN-B 10065) : chélicèdes droit, face externe. G, ♀ 29,3 × 35,6 mm, MUSORSTOM 1, st. 5 (MNHN-B 10066) : face externe du grand chélicèdes.




PLANCHE III

- A-H, *Carcinoplax monodi* sp. nov. : A, B, paratype, ♂ 24 × 33 mm, golfe de Suez, st. III, MONOD det. *C. longimanus* (var. *indica*) (MNHN-B 10273) : A, vue d'ensemble ; B, chélicèdes, sans crête à la face interne. C, D, paratype, ♂ 18 × 25 mm, golfe de Suez, st. XXXV, MONOD det. *C. longimanus* (var. *indica*) (MNHN-B 10378) : C, vue d'ensemble ; D, chélicèdes, face externe. E, paratype, ♀ juv. 9 × 13 mm, mer Rouge, st. XXIV, MONOD det. *C. longimanus* (var. *indica*) (MNHN-B 10274) : carapace. F-H, ♀ 17,5 × 25 mm, Vor Ras el Aswad, südl. Jeddah, st. Va-22/122-TA, TÜRKAY det. *Carcinoplax* sp. (1) (SMF) : F, carapace et chélicèdes ; G, chélicèdes, face externe ; H, *id.*, face interne, sans crête.
- I-K. — *Carcinoplax* sp. (aff. *monodi* sp. nov.), ♀ ovigère 11,2 × 15,5 mm (sans épines) × 16,4 mm (avec épines), mer Rouge, Pola Exp., st. 51, BALSS det. (1929) *C. purpurea* (var. ; an sp. nov. ?) (NHMW) : I, vue d'ensemble ; J, grand chélicèpe, face externe ; K, *id.*, face interne, sans crête longitudinale (photographie SMF, E. HAUPT).