


## PLANCHE IV

A-K, *Carcinoplax purpurea* Rathbun. — Variations en fonction de l'âge et du sexe. A-C, holotype, ♀ 29,5 × 38,2 mm, Philippines, *Albatross*, st. 5376 (USNM 46143) : A, carapace, avec l'armature antéro-latérale émoussée ; B, chélicèdes, face externe, sans coloration noire des doigts ; C, *id.*, face interne, avec une crête longitudinale. D, E, ♀ 26,1 × 33,2 mm, Philippines, MUSORSTOM 1, st. 45 (MNHN-B 10144) : D, carapace, avec l'armature antéro-latérale émoussée ; E, chélicèdes, face externe. F-H, ♀ 12,1 × 16,3 mm, MUSORSTOM 1, st. 72 (MNHN-B 10172) : F, vue d'ensemble ; G, *id.*, carapace, avec l'armature antéro-latérale non émoussée ; H, chélicèdes, face externe. I, ♂ 14,1 × 19 mm, MUSORSTOM 1, st. 56 (MNHN-B 10171) (photographie C. VADON) : vue d'ensemble. J-K, juv. 4 × 4,5 mm, Philippines, *Albatross* (même échantillon que l'holotype figuré en A-C) (USNM 46143) : J, carapace, avec les deux dents antéro-latérales subégales ; K, chélicèdes, face externe.



## PLANCHE V

A-I, *Carcinoplax sinica* Chen : A, B, B1, C, C1, ♂ 29 × 45 mm, Iranian Gulf, st. 25, STEPHENSEN det. *Carcinoplax (purpurea ?)* (ZMC) : A, vue d'ensemble (photographie SMF, E. HAUPT) ; B, B1, petit chélicède, face externe (B), face interne (B1), avec la crête longitudinale émoussée ; C, C1, *id.*, grand chélicède, face externe (C), face interne (C1). D, E, E1, ♂ 15 × 22 mm, même provenance que A-C, STEPHENSEN (1945) det. *C. (purpurea Rathbun ?)* (ZMC) : D, vue d'ensemble (photographie SMF, E. HAUPT) ; E, grand chélicède, face externe ; E1, *id.*, face interne, avec la crête longitudinale présente mais peu visible sur ce cliché. F, ♀ 27 × 41 mm, MUSORSTOM 1, st. 1 (MNHN-B 10142) : vue d'ensemble ; G, chélicèdes, face externe ; H, ♂ 18,3 × 23,8 mm, MUSORSTOM 1, st. 1 (MNHN-B 10142) : vue d'ensemble (photographie C. VADON) ; I, ♂ 11,6 × 15,1 mm, MUSORSTOM 1, st. 1 (MNHN-B 10142).