

コシオリエビ科 (Galatheidae)
ヒヅメコシオリエビ属 (*Lauriea*)

ヒヅメコシオリエビ


Lauriea gardineri

- 分布
伊豆半島以南
パラオ, オーストラリア
北部, インド洋, 紅海
- 生息環境
サンゴ礁, 岩礁, 礁斜面,
(カイメン類)
- 生息水深
15m 以深



雄 / 静岡県 (大瀬崎) / 水深: 14m / 甲長: 0.6cm
撮影: 峯水 亮

岩礁の礁斜面の岩肌に生えるザラカイメンやワタトリカイメン, ミズガメカイメンなどに共生し, 宿主が枝別れする基部や外側のひだなどに, たいてい雌雄で隠れすむ。体色は, 半透明の淡黄色。長毛でおおわれる。雌では白と赤の隣接する斑点がまばらに散在するが, 雄の斑点は不鮮明。眼に赤褐色の斑点が散在する。



雌
撮影: 鈴木 敬宇

コシオリエビ科 (Galatheidae)
ヒヅメコシオリエビ属 (*Lauriea*)

ピンクスクワット ロブスター

Lauriea siagiani

- 分布
フィリピン, インドネシア
- 生息環境
サンゴ礁, 礁斜面, (カイメン類)
- 生息水深
15m 以深



インドネシア (バリ島) / 水深: 20m / 甲長: 1cm

撮影: 峯水 亮

サンゴ礁や岩礁に生息するイワカイメン科の大型のつぼ状カイメン (*Xestospongia testudinaria*) に共生し, 宿主の側面にある縦溝の間の方付近に隠れすむ。体色は鮮やかなピンク色で,

明紫色の細線が歩脚や甲の周縁にある。体全体にブラシ状の毛が密に生える。日本からの記録はまだなく, 和名もついていない。